

(劉竹林)

●康健測驗（徐鴻志）

【一】指甲上白色半月形部分充滿的。

【二】脈息跳動每分鐘在七十二次左右的。

【三】每天有一次通暢的大便。

【四】小便在二十四小時內不變色生沉澱的。

【五】下眼皮血色鮮明紅潤的。

【六】沒有黃白黑各種顏色的舌苔的。

【七】睡眠甜暢不做夢的。

【八】飲食有味食量如常的。

【九】腦固精厚調經活血的。

【十】呼吸深長精神健旺的。

便血之研究

風之成。因太陽風邪侵入陽明。煽動厥陰內風。風爲陽邪。久則變火。火迫絡傷。血清色鮮。四射如瀉。治法以清火養血爲主。火清血寧。而風自熄矣。槐角丸主之。卽槐角。地榆。黃連。黃芩。黃柏。生地。當歸。川芎。防風。荆芥。側柏。枳殼。烏梅。生薑。遠血。先便後食者。主脾虛氣寒。營行失度而下。脾去肛門遠故名。宜黃土湯主之。近血先血後便者。由大腸傳於濕熱。熱傷絡脈。滲漏而下。大腸與肛門近故名。宜赤小豆當歸散主之。或以治癰毒方加黃柏治之亦可。勞傷下血。勢力羸脾。脾不攝血。血從大腸以下。歸脾湯主之。陽明燥熱下血。予一友人患消食易飢起因。忽血大吐六下。良由陰虛陽明火熾。故燥殺易飢。繼則陰陽絡並傷。故上下吐瀉。此等症。極易脫營。宜急以量便止之。白虎湯或犀角地黃湯清之。鮮生地血石斛。西洋參。養之。倘脈伏汗多。急以獨參湯漬之。中寒下血。因飲食生冷。兼之陽氣伏汗。血爲寒凝而下。必服痛色散。宜附子理中湯。倍炮薑。加酒連。內痔便血。宜地榆炭。槐花炭。炒當歸。炒荆芥。炒銀花。鹽連丸等主之。氣陷下血。血隨氣行。中氣下陷。則血亦循行緩滯。停頓於下。向大腸而泄。須用補中益氣湯舉之。跌撲內損。惡血入腸。下出瘀濁者。用當歸導滯湯主之。卽大黃。當歸。丹皮。桃仁。紅花。白芍。乳沒。生地。桂枝。柴胡。黃芩。枳殼。甘草。加麝香少許。腎液虛不能濡潤大腸而下血者。六味湯加歸膠主之。

病女婦

法治種各有內書本

| | | | | |
|-------|-------|-------|-------|----|
| 簡明辨症法 | 求孕利胎法 | 經漏自療法 | 橫生急救法 | 至書 |
| 心理退斑法 | 辨別胎孕法 | 痛經立止法 | 倒產急救法 | 注裝 |
| 實驗退斑法 | 臨產預知法 | 經水辨色法 | 坐臂產治法 | 一大 |
| 根本美容法 | 暗產避免法 | 乾血癆治法 | 背脊生治法 | 厚冊 |
| 肝氣自療法 | 通乳神效法 | 立下跑衣法 | 偏左急治法 | 特收 |
| 血崩急救法 | 難產催生法 | 產門退腫法 | 盤腸露治法 | 祇收 |
| 久帶靈效法 | 產後接瘀法 | 產後救暈法 | 悶膈生治法 | 大洋 |
| 不藥治病法 | 避孕簡便法 | 陰察治○法 | | 四角 |

發行 上海 三馬路 寶善堂

經

(十)肝胃氣救急方

（草決明）
嬰粟花三片。老薑三片。開水
沖服。

(十二) 翻胃嘔吐驗方

（前人）
（甲）白蔻仁二錢。檀香二錢。
川鬱金二錢共爲末 每服七分

薑汁調藥。陳紹酒送服。

(乙) 廣陳皮二錢。姜半夏三錢。左金丸六分。

內用醋缸內虫。焙乾研末調服。立效。

(十二) 翻胃噎膈驗方
(前人)

申) 薑撥研末三分。丁香油二

○各藥拌勻。○作數次服。○或同飯食。

孕婦惡阻

(尤學周)

【原因】有謂妊娠以後。身體內部營養。照常應付外。又須供養胎兒。致胃內發生變化。有謂子宮內發生變化。刺激胃部而成。其說以後者爲是。

劇者不但每食卽吐。卽在空心餓肚時。腹中絲毫無物。亦嘔吐不休。以此點水不能下咽。因而虛弱。漸至困頓異常。神疲力乏。頭暈目眩。

【療法】輕者不必服藥。靜心耐養。久能自止。因感情之衝動。或受重大刺激。亦能自愈。吐之劇者。須從事調理。半夏二錢。茯苓二錢。生薑三片。先用伏龍肝五錢。打碎和水攪混。靜置。取澄清之水煎藥。服之甚驗。

內科
小兒科
專家尤學

小兒科

【時間】 上午九時至十二時。

【診金】 門診一元。出診四元。
。膏方四元。丸方四元。
。通函論症二元。

【診所】 上海盆湯弄橋北北山
西路泰安里第四弄五
十八號